

**Секция "Изток" – СМБ**  
**КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 10.12.2011 г.**  
**10 клас**

**Времето за решаване е 120 минути.**

**Регламент:** Всяка задача от 1 до 9 има само един верен отговор. "Друг отговор" се приема за решение само при отбелязан верен резултат. Задачите от 1 до 3 се оценяват с по 3 точки, задачите от 4 до 6 се оценяват с по 5 точки, задачите от 7 до 9 се оценяват с по 7 точки. Задача 10 се решава подробно и се оценява с 15 точки.

**Организаторите Ви пожелават успех?**

Име.....училище.....град.....

**Зад 1.** Стойността на израза  $\sqrt{2} - 3 + \sqrt{(1 - \sqrt{2})^2}$  е:

- а) - 2;                                      б)  $2\sqrt{2} - 4$ ;                                      в) 2;                                      г) друг отговор

**Зад 2.** Сборът от различните реални корени на уравнението  $x^4 - 5x^2 - 6 = 0$  е:

- а) 5;                                      б) - 5;                                      в)  $2\sqrt{6}$ ;                                      г) друг отговор.

**Зад 3.** Решенията на неравенството  $-x^2 + 5x + 6 \geq 0$  са:

- а) интервал с дължина 7;                                      б) интервал с дължина 5;  
в) обединение на два безкрайни интервала;                                      г) друг отговор.

**Зад 4.** Броят на различните корени на уравнението  $(x^2 - 2x)^2 - (x^2 - 2x) - 2 = 0$  е:

- а) 1;                                      б) 2;                                      в) 3;                                      г) друг отговор

**Зад 5.** В една и съща координатна система са построени графиките на функциите  $f(x) = x^2 - 2x + 2$  и  $g(x) = x^2 - 10x + 29$ . Разстоянието между върховете им е:

- а) 3 м.ед.;                                      б) 4 м.ед.;                                      в) 5 м.ед.;                                      г) друг отговор

**Зад 6.** Стойностите на параметъра  $k$ , за които графиката на  $f(x) = x^2 - 4x + k^2 - 3k$  се допира до абсцисната ос са:

- а) - 1;                                      б) 0;                                      в) 4;                                      г) друг отговор

**Зад 7.** Даден е квадрат  $ABCD$  със страна  $a$ . Точките  $M$  и  $N$  са съответно от страните  $BC$  и  $DC$  така, че  $BM = CN = \frac{a}{3}$ . Лицето на  $\Delta AMN$  е:

- а)  $\frac{a^2}{2}$ ;                                      б)  $\frac{7a^2}{18}$ ;                                      в)  $\frac{2a^2}{3}$ ;                                      г) друг отговор

**Зад 8.** Даден е правоъгълен  $\Delta ABC$  с лице  $45 \text{ cm}^2$ . Височината към хипотенузата я дели в отношение 1:4. Дължината на по-големият катет е;

- а)  $6\sqrt{5} \text{ cm}$ ;                                      б)  $3\sqrt{5} \text{ cm}$ ;                                      в)  $\sqrt{5} \text{ cm}$ ;                                      г) друг отговор

**Зад 9.** Броят на целите стойности на параметъра  $m$ , за които корените на уравнението  $x^2 + mx + 2012 = 0$  са само цели числа е:

- а) 3;                                      б) 6;                                      в) безброй много;                                      г) друг отговор

**Зад 10.** Дадени са функциите  $f(x) = x^2 - 4x + 6$  и  $g(x) = \sqrt{x(4-x)}$

а) Намерете най-малката и най-голямата стойност на  $f(x)$  и  $g(x)$  в общата им дефиниционна област

б) Решете уравнението  $x^2 - 4x + 6 = \sqrt{x(4-x)}$

**Отговори:** 1 Б; 2 Г - 0; 3 А; 4 В; 5 В; 6 Г 4, - 1; 7 Б; 8 А; 9 Б

**Зад 10.** а) общата ДО е  $x \in [0,4]$  2 точки

определяне, че най-малката стойност на  $f$  се достига при  $x = 2$  1 точка

определяне, че най-голямата стойност на  $f$  се достига при  $x = 0$  и  $x = 4$  1 точка

пресмятане на  $f_{\min} = f(2) = 2$  и  $f_{\max} = f(0) = f(4) = 6$  2 точки

определяне, че най-голямата стойност на  $g$  се достига при  $x = 2$  1 точка

определяне, че най-малката стойност на  $g$  се достига при  $x = 0$  и  $x = 4$  1 точка

пресмятане на  $g_{\max} = g(2) = 2$  и  $g_{\min} = g(0) = g(4) = 0$  2 точки

**б) I начин**

Най-голямата стойност на  $g$  и най-малката стойност на  $f$  са равни и се достигат

едновременно при  $x = 2$ , следователно единствения корен е  $x = 2$ . 5 точки.

**II начин**

Полагаме  $t = \sqrt{x(4-x)}$  или  $t = 4x - x^2$  1 точка

Получаване на съответното уравнение  $t^2 + t - 6 = 0$  или  $\sqrt{t} = 6 - t$  1 точка

Получаване на съответните стойности на  $t$  и отхвърляне на излишните. 2 точки

Получаване на единствения корен е  $x = 2$ . 1 точка

Задачата може да се реши и след повдигане на втора степен и получаване на уравнение от четвърта степен, което може да се отдели точен квадрат  $(x-2)^2$  и квадратен тричлен с отрицателна дискриминанта.

Стефчо Наков  
Монтана